

“酷柏” 佰美視睛潤散光日拋軟性隱形眼鏡

“CooperVision” Biomedics® 1 day Extra Toric Soft Contact Lenses

使用前請必詳閱頭段之說明並遵循指示。

重要資訊：
此說明書提供眼科醫師或患者參考，眼科醫師或患者須提供
資訊適當且配合患者之處方鏡片的指導手冊及資訊手冊。

符號	處 方
	表示：本裝置由有執業的藥師審批或訂閱。
	警衛照傷害。
	有效期日期。
	批號。
	使用滅菌藥瓶。

產品說明

“酷柏” 伯美視睛潤散光日拋軟性隱形眼鏡是日戴型並為每日拋棄式鏡片，其鏡片是由既可塑性 - 2-hydroxyethyl methacrylate 和 methacrylic acid 組合物與 ethylene glycol dimethacrylate (45%) 和水 (55%) 等所組成的。這類片為淚液容易於操作使用。

鏡片規格：

直 徑	12.5 mm ~ 18.0mm
中 心 厚 度	0.025mm ~ 0.270mm (依度數決定)
基 底 徑	6.50mm ~ 10.8 mm
度 數	-20.00D ~ +0.00D
散 光 度 數	-0.25D ~ -10.00D
轉 心	10° ~ 180° (每10度為一間隔)

鏡片的物理如下：

折 射 率	1.41
鏡 片 表 面	親水性
含 水 量	55%
透 氧 率 (DK)	19.7 ± 21 ± 10 ⁶ (cm ² /sec) (mL O ₂ /m ² x mm ²)
透 光 率	(在標準33度以att Method) 90% to 97% depending on tint type

作用：在含水狀態，放在人的角膜上，其作用就靠一般折射傳導體，使光線集中於觀察點。

適應症：近視、遠視散光矯正。

禁忌症：(不適用的理由)

患者倘若下列情況，不能使用“酷柏” 伯美視睛潤散光日拋軟性隱形眼鏡：
● 任何感染症、外傷、或影響角膜、結膜、或眼瞼的異常。
● 各種微生物感染。
● 眼球震盪不足。
● 角膜感覺遲鈍。
● 瞳孔過度擴張，而導致玻璃狀或因配戴隱形眼鏡所引起不良作用或不能忍受。
● 不能依賴隱形眼鏡的架構和探測器序。

● 因為患者，生、心臟病況，而無法工作生活工作環境不能依

頤或不能忍受插戴過程或佩戴眼鏡。

- 對於特殊隱形眼鏡必需使用的溶液中的成份，如潤滑劑或水，過敏。
- 提供視力矯正的使用者，若要不能不能接受隱形眼鏡配戴與保養程序之要求者不能提供隱形眼鏡。

警告：

診斷性散光過以下特徵狀的你也不應子配戴隱形眼鏡：

- Rose Bengal染色>1/10等級。
- Fluorescein染色>12/15等級。
- 薦避隱形眼鏡 8.0~4.0mm

臨向請見列出下列的警告：

- 有問題的隱形眼鏡和隱形眼鏡製造商可能導致眼睛健康的傷害。必須避免將隱形眼鏡和隱形眼鏡的元件以不正確的方法使用，包括用隱形眼鏡及隱形眼鏡製造商，包括隱形眼鏡盒和隱形眼鏡，包括角膜炎，可能扭傷並導致失明。日戴研究已顯示，戴著鏡片過夜會增加佩戴反應的嚴重性。研究顯示吸煙的人在戴隱形眼鏡比不吸煙的人更容易發生副作用。如果患者感觉得眼睛不舒服，眼睛乾燥，視力變差，眼睛發紅或其他問題，應該立刻諮詢指示拿掉鏡片，並立即回顧眼科醫生。

注意事項：

- 圓形隱形眼鏡可能不适合某些特定職業，需要有保護眼睛之項目。
- 必須避免過量，次數與時間（或多個的環境）。
- 不可用溶液或水或用溶液洗的隱形眼鏡。
- 化妝品、化妝水、肥皂、乳霜、及長期或短暫避免直接接觸在隱形眼鏡上，以免造成隱形眼鏡或隱形眼鏡的污染。
- 避免隱形眼鏡與化妝品或皮膚接觸。
- 不勿用針或其它工具從隱形眼鏡上移出隱形眼鏡，將隱形眼鏡倒置手中。
- 此款隱形眼鏡可能需要以下的以下隱形眼鏡。

- Fluorescein不適用於戴隱形眼鏡的隱形眼鏡會吸收此染劑而使其變色。Fluorescein要使用於眼鏡時，應用無菌生理鹽水滴溼，必要時一小時後可以在戴新鏡片，此新鏡片必須在清潔後使用。
- 清潔隱形眼鏡時，請勿將隱形眼鏡直接放置於鏡盒、鏡盒蓋、鏡盒內，或任何可能沾染到隱形眼鏡的表面，例如：化妝品、肥皂、乳霜、及長期或短暫避免直接接觸在隱形眼鏡上，並可造成隱形眼鏡受損，把鏡片拿走，並立即回顧專業人員或定期回顧，並且立即治療，以避免隱形眼鏡受損。

隱形眼鏡的保養

軟性隱形眼鏡摘取眼鏡以後，隱形眼鏡在空氣中，其表面會變乾且逐漸失去水份，倘若發生此情形時，應將隱形眼鏡，使用新鏡片，並立即回顧專業人員或定期回顧，以免隱形眼鏡受損，如果隱形眼鏡在那裡上（不成形狀移動），應終止患者其實的摘機消毒使用生理清潔，或隱形眼鏡護理液直到隱形眼鏡，等到鏡片乾爽由移動，如果部分鏡片以後鏡片仍然沒有移動，患者應隨時回顧其隱形眼鏡隱形眼鏡。

如何供給：

顧客： 伯美視睛潤散光日拋軟性隱形眼鏡是裝在附有食鹽緩衝液的塑膠包裝盒中，並於滅菌後供給，每一包外部都印有鏡片的基本資料，屈光度數，製造批號及製造日期，如果包裝已經破損，請勿使用。

包裝： 1片/盒、10片/盒、15片/盒、20片/盒、30片/盒

製造地點： CooperVision Caribbean Corporation
製造地點： 500 Road 584, Lot 7, Anselas Industrial Park,
Juana Diaz, PR 00795, U.S.A.

總售名稱： 酷柏光學股份有限公司

總售地址： 臺北市中山區延平北路一段66號6樓

新醫智醫學字第024428號

· 陰臭劑、或潤滑劑或防腐劑未達到鏡片，油性化妝品比水性化妝品更能有效抑制細菌。

- 如隱形眼鏡結合外斜材料，請勿用手或手指觸摸，因為可能造成微小的創傷，導致視覺受損，威脅及眼睛。
- 日戴隱形眼鏡通常沒有宿主性或耐候性蒸氣和微塵。
- 有些隱形眼鏡可能含有某些成分，可能導致對隱形眼鏡的過敏。
- 有些隱形眼鏡可能含有某些成分，可能導致對隱形眼鏡的過敏。
- 任何隱形眼鏡，皆需要定期以確保健康，應指示病患適當的回顧時程。

副作用：

- 這些隱形眼鏡可能會產生下列問題：
- 田園地處。
- 有的煩惱、頭痛或疲勞。
- 可能比第一次戴著時更不舒服。
- 可能感覺隱形眼鏡有東西（外物、割傷的部位）。
- 泪過多。
- 不正常的瞬目分泌物。
- 眼睛乾燥。
- 眼睛不適。
- 眼睛不良好，物體周圍出現光暉或光斑。
- 眼睛頭痛。
- 瞬目過乾。

如有上述情形出現應依下列指令：

- 在家休息。
- 如果不舒適或問題停止，請立即檢查鏡片。
- 清潔鏡片，或者在水浴或溫水停止時，應清潔與潤滑鏡片，或將鏡片丟棄在新鏡片。

● 如隱形眼鏡在阿波羅，請立即回顧其云客。

- 若隱形眼鏡在鏡片之後，如非隱形眼鏡存在，患者就不要戴隱形眼鏡，而應立即回顧其隱形眼鏡專業者或醫生，若隱形眼鏡前有之細胞，患者必須依其隱形眼鏡專業者或醫生，徹底治療，方能恢復正常。如果隱形眼鏡在鏡片之後，可能出現隱形眼鏡，此時應停止戴隱形眼鏡，並立即回顧專業人員或定期回顧，並把鏡片拿走，並立即回顧專業人員或定期回顧。